

DIVERSE TRAPPOLE A CONFRONTO

Quale trappola identifica con maggior precisione l'inizio dei voli ?
Quale trappola cattura il maggior n° di adulti nella stagione ?



esca	trappola
200 ml aceto mela	1-14
200 ml Droskidrink + 4 gr.zucchero canna grezzo	2-4-5-6-7-8-11-15-16
200 ml aceto vino rosso	3
300 ml esca proteica per <i>Ceratitis capitata</i>	9
300 ml esca proteica SWD specifica	10
200 ml acqua + 4 gr. lievito di birra + 8 gr. zucchero canna grezzo	12
80 ml Monterey bait (USA) + 120 ml acqua	13

DIVERSE TRAPPOLE A CONFRONTO

Quale trappola identifica con maggior precisione l'inizio dei voli ?

Bosco
Vigolo V.

sett.	data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19-25	08/05-18/6	0	np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	25/6	0		0	0	1F	0	0	1M	0	0	0	1M

Ciliegio
Costasavina

sett.	data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19-24	08/05-11/6	0	np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	18/6	0		0	0	0	0	0	1F	0	0	0	0

Ciliegio
S.Caterina

sett.	data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19-25	08/05-18/6	0	np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	25/6	0		1F	0	0	0	0	0	0	0	1M	0

Ciliegio
Vigolo V.

sett.	data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19-26	08/05-25/6	0	np	0	0	0	0	np	np	0	0	0	0
27	2/7	0		0	0	1M+1F	1F			0	0	0	0

Ciliegio
Susà

sett.	data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16-18	17/4-02/5	0	np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8/5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1F	0

compost
S.Michele


sett.	data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17/4	0	0	0	0	0	0	0	1M	0	0	0	0	0	0



- Informazione utile, specie su ciliegio, a scopi decisionali
- In tutti i casi esaminati, le prime catture sono state realizzate con l'esca **Droskidrink** in **trappole rosse**
- Il modello n° 8 fa segnare le prime catture nel 50% dei casi: il modello n°5 ha il > n° medio di adulti/trappola (1,5): buone prestazioni anche per il modello n°11, il più economico
- In due casi (bosco a Vigolo V. e ciliegio a S.Caterina), anche le esche a base di aceto di vino e la soluzione acqua + lievito birra + zucchero, tra quelle che hanno catturato i primi adulti

DIVERSE TRAPPOLE A CONFRONTO

Quale trappola cattura il maggior numero di adulti lungo un'intera stagione ?



- Nel complesso della stagione (sett.29-47), il mod.n°5 si distingue da tutti gli altri con differenze statisticamente significative, fatta eccezione per i mod.n°7 e 16