VASO TRAP ROUGE

M A D E I N I T A L Y

PIÈGE POUR DROSOPHILA SUZUKII

(piège chromatique pour le piégeage de masse du moucheron asiatique avec appât alimentaire)



OÙ L'UTILISER: Plantes de petits fruits: cerises, fraises, mûres, framboises, groseilles, myrtilles, etc.

UTILISEZ CES QUANTITÉS AVEC: Vaso Trap Rouge + un bocal en verre de 1 Kg (no Bormioli)

COMMENT FAIRE: Introduire dans le bocal 250 ml de vinaigre de pomme + 100 ml de vin rouge + un cuillère à soupe de sucre

REMPLACEZ L'APPÂT: OUI, toujours chaque 15 jours

L'appât est testé et recommandé par la Fondation Edmund Mach <u>FEM</u> à San Michele all'Adige (TN) avec d'excellents résultats.

Nous recommandons l'utilisation de Tap Trap Rouge après avoir détecté la présence de Suzukii en plaçant le piège sélectif Vaso Trap Rouge autour du périmètre de la zone à défendre quelque temps avant le début de la saison. Tap Trap Rouge est excellent pour aider au piégeage de masse décisif une fois que la présence de la Drosophila S. a été

détectée. Dans la section Nouvelles de notre site web, vous trouverez des informations utiles sur l'utilisation des pièges pour Drosophila S. - www.taptrap.com

MES NOTES (notez les dates auxquelles vous posez le piège et renouvelez l'appât)

PIÈGE	APPÂT	APPÂT	APPÂT	APPÂT	APPÂT
	•••••		•••••	•••••	
	•••••			•••••	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					